



ดูโอ  
อัปผิวแน่น



HarmonyCa™ คือ...?

สารเติมเต็มผิว รูปแบบเจล ประคบด้วยการผสมผสาน สาร 2 ชนิด คือ CaHA และ HA Carrier

ช่วยเติมเต็มผิว อัปผิวแน่น

การดูแลตบเรื่องกายหลังการฉีด

HarmonyCa™



- หลักเลี่ยงศักยกรรมที่ต้องออกแรงมากและสัมผัสถูกบังคับและแสดงแผล ในการฉีด 24 ชั่วโมงแรก หลังจากการรักษา เพื่อลดรอยแดงและการระคายเคือง
- ประคบหน้าเข้ม หรือประคบเข้ม ในบริเวณที่ได้รับการรักษาเพื่อลดอาการอักเสบ หลังการฉีด 24 ชั่วโมง แรก
- อาการบ้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ รอยแดง บวม ปวด คัดจมูก และคัน ซึ่งสามารถหายได้ ภายใน 24-48 ชั่วโมง ส่วนอาการบวมจะหายภายใน หนึ่งสัปดาห์ หากมีค้อนประคุณขึ้น ควรพบแพทย์เพื่อรับการดูแล



# ຖរវិបាទ

## ວ້າງວົງຂ້ອມລຈາກ

1. Allergan Aesthetics. HArmonyCa™ Lidocaine IFU August 2023  
2. Urdiales-Gálvez E et al. J Cosmet Dermatol. 2023;00:1-12.

ผลลัพธ์ก็ได้อิ่มกับแต่ละบุคคลและความช้านานของแพ้กี้ผ่านการรักษา สามารถสื่อสารกับคนอื่นเพื่อเติมเต็มได้กับคลาสการแพ้กี้ ผลลัพธ์ก็จะให้ได้อิ่มแบบอันวิชาชีพเวชกรรมเก่าญี่ปุ่น

**CONTRA-INDICATIONS:** Do not inject HARMONYCA™ Lidocaine in patients with a known sensitivity to any of the product components, suffering from skin disease or abnormal skin conditions, suffering from an infection or inflammation (either acute or chronic) at or near the treatment site, patients susceptible to keloid formation, hypertrophic scarring, or developing inflammatory skin conditions, patients with impaired wound healing due to systemic disorders, medicinal drugs, or unhealthy or poorly-vascularized tissue, suffering from prolonged bleeding or tissue healing due to medical conditions or medicinal drugs, patients with a history of anaphylactic reactions and/or multiple severe allergies, patients with a known sensitivity to steroids, or who are contraindicated to be treated with steroids. Do not inject into glabellar or periorbital areas, lips and perioral region, and regions containing foreign bodies. Do not inject into blood vessels and highly vascularized areas, epidermis, or superficial dermis. Patients who are presenting with herpes, autoimmune diseases, are breastfeeding or pregnant women, are below the age of 18, have known hypersensitivity to lidocaine or to other amide-type local anesthetics, and with conditions for which lidocaine is contraindicated.

HArmonyCa™ Lidocaine  
ເລກທີໃນອຸບັນຍາດ 67-2-1-2-0005770  
TH-HAR-240009 | ໃນອຸບັນຍາໂຄ້ນສາເລຂທີ ຂວ.163/2568

HarmonyCa™

Allergan Aesthetics  
an AbbVie company

บริษัท แอดเวิร์ฟ ฟาร์มาซูซิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
29 อาคารพาณิชย์ ถาวรสุข ชั้น 16 บูรีบีชแอร์พอร์ต แขวงขันต่อ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย  
โทร. +66 2 460 7717